


comunes de Playa Ventura, Copala, Guerrero

comunes de Playa Ventura, Copala, Guerrero



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Guía de aves comunes de Playa Ventura, Copala, Guerrero

César Daniel Jiménez Piedragil, Laura López Castillo, Alejandro
García Flores, Luis Giovanni Cassani López, Juan Carlos Morales
Hernández, Olivia Osorio León y Alejandro de Jesús Medrano Silva



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Jiménez Piedragil, César Daniel, autor

Guía de aves comunes de Playa Ventura, Copala, Guerrero / César Daniel Jiménez Piedragil, Laura López Castillo, Alejandro García Flores, Luis Giovanni Cassani López, Juan Carlos Morales Hernández, Olivia Osorio León y Alejandro de Jesús Medrano Silva.-- Primera edición. – México : Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2026.

58 páginas : ilustraciones a color

ISBN 978-607-2646-88-9

1. Aves – Guerrero (Estado) – Copala 2. Aves – Identificación – Guerrero (Estado) 3. Aves marinas – Identificación

LC QL686

D 598.2972

Esta obra fue dictaminada por pares académicos bajo la modalidad doble ciego.

Guía de aves comunes de Playa Ventura, Copala, Guerrero
Primera edición, agosto de 2026.

D.R. 2026, César Daniel Jiménez Piedragil, Laura López Castillo, Alejandro García Flores, Luis Giovanni Cassani López, Juan Carlos Morales Hernández, Olivia Osorio León y Alejandro de Jesús Medrano Silva (autores)

D.R. 2026, Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Av. Universidad 1001, col. Chamilpa
CP 62209, Cuernavaca, Morelos
publicaciones@uaem.mx
libros.uaem.mx

Diseño y maquetación: Alejandro de Jesús Medrano Silva

ISBN: 978-607-2646-88-9

DOI: 10.30973/2026/guia_aves_copala



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Licencia Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Hecho en México

AGRADECIMIENTOS Y CRÉDITOS

Esta guía surge como resultado del interés de los habitantes por conocer la avifauna de su localidad y del esfuerzo en conjunto de los catedráticos del Centro de Investigaciones Biológicas y de los alumnos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAEM por fomentar el acervo cultural y la apreciación de los recursos naturales.

Fotografías: Alberto Rafael Hans Vadas Thomaes, César Daniel Jiménez Piedragil, Claudia Cristina Valenzuela Inzunza, David Ramírez Adame, Diego Alfonso Guerrero Lara, Ecatzin Alejandro Ramírez Segura, Edgar Enrique Neri Castro, Frabrizio Varela Boydo, Félix Santiago Quiroz, Jorge Enrique Díaz Noyola, Judith Areli Najera Núñez, Olivia Osorio León, Óscar Josué Amaro Flores y Rafael Rodríguez Brito.

Producción: Asociación de Colonos para el Desarrollo Sustentable de Playa Ventura, Centro de Investigaciones Biológicas y Universidad Autónoma del Estado de Morelos.



Foto: Olivia Osorio León

CONTENIDO

I. Prefacio.....	7
II. Área de estudio.....	9
III. Características de las aves.....	11
IV. Cómo funciona esta guía.....	15
V. Aves comunes de Playa Ventura	
Orden Columbiformes.....	19
<i>Columbina inca</i>	
<i>Columbina passerina</i>	
Orden Gruiformes.....	21
<i>Gallinula galeata</i>	
<i>Fulica americana</i>	
Orden Charadriiformes.....	23
<i>Himantopus mexicanus</i>	
<i>Anarhynchus nivosus</i>	
<i>Jacana spinosa</i>	
<i>Actitis macularius</i>	
<i>Thalasseus maximus</i>	
<i>Thalasseus elegans</i>	
Orden Suliformes.....	29
<i>Fregata magnificens</i>	
<i>Nannopterum brasilianum</i>	
Orden Pelecaniformes.....	31
<i>Pelecanus occidentalis</i>	
<i>Tigrisoma mexicanum</i>	
<i>Ardea herodias</i>	
<i>Ardea alba</i>	
<i>Egretta thula</i>	
<i>Egretta caerulea</i>	
<i>Ardea ibis</i>	
<i>Butorides virescens</i>	
<i>Nycticorax nycticorax</i>	

Orden Cathartiformes.....	40
<i>Coragyps atratus</i>	
<i>Cathartes aura</i>	
Orden Accipitriformes.....	42
<i>Pandion haliaetus</i>	
<i>Rupornis magnirostris</i>	
<i>Buteo plagiatus</i>	
Orden Piciformes.....	45
<i>Melanerpes chrysogenys</i>	
Orden Falconiformes.....	46
<i>Caracara plancus</i>	
<i>Falco sparverius</i>	
Orden Passeriformes.....	47
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	
<i>Pitangus sulphuratus</i>	
<i>Tyrannus melancholicus</i>	
<i>Tyrannus forficatus</i>	
<i>Mimus polyglottos</i>	
<i>Icterus spurius</i>	
<i>Icterus pustulatus</i>	
<i>Quiscalus mexicanus</i>	
VI. Bibliografía.....	56

PREFACIO

IMPORTANCIA DE LAS AVES DE LA REGIÓN

El propósito de esta guía es dar a conocer las aves de este hermoso lugar conocido como Playa Ventura, ya que es una localidad en donde se les puede observar en distintos tipos de vegetación. El objetivo de esta obra es transmitir a los visitantes y lugareños la importancia que tienen las aves en los diferentes hábitats que visitan o en los que residen. Además, se busca recalcar los servicios ambientales que prestan estas especies al embellecer el lugar con sus cantos y coloridos plumajes, así como su relevante papel como agentes dispersores de semillas de varios frutos que se producen en la región, como polinizadores de algunas plantas con flores de la selva e, inclusive, como participantes en el control de las poblaciones de insectos en los humedales y cultivos.

Esta *Guía de aves comunes de Playa Ventura, Copala, Guerrero* consta de 37 especies que se hallan en diferentes hábitats como es la selva baja caducifolia, litoral costero, humedales y plantaciones. Refleja una pequeña parte de la diversidad avifaunística de nuestro país que alberga 1,150 especies que representa el 11% de las aves del mundo, esto sitúa a México en el onceavo lugar de acuerdo con su riqueza avifaunística y en cuarto lugar en endemismos con respecto a los países megadiversos (Navarro-Singuenza et al., 2014). La planicie costera del Pacífico es una de las zonas con mayor riqueza de especies endémicas (Navarro-Singuenza et al., 2014).

Nuestra misión es crear conciencia entre el público de cómo las actividades humanas pueden afectar los diferentes hábitats de estas especies que residen y migran. El enfoque de esta guía es sensibilizar a las personas que visitan el lugar para que aprecien la naturaleza y las interacciones que tienen las aves con los diferentes componentes de esta y de ahí la importancia de conservarlas.



Foto: Diego Alfonso Guerrero Lara

ÁREA DE ESTUDIO

PLAYA VENTURA, COPALA, GUERRERO

MEDIO FÍSICO

Localización

Pertenece a la región de la Costa Chica, se localiza al sureste del estado de Guerrero. Playa Ventura está situado al oeste de los márgenes del río Copala, al noroeste se encuentra la cabecera municipal de Copala, al este se localiza la Barra de Teconapa y al sur colinda con el océano Pacífico. Se halla entre las coordenadas geográficas 16°32'42" N y 98°55'40" O, es conocida como la colonia Juan N. Álvarez.

Hidrografía

Se conforma principalmente por el río Copala que nace en la sierra de Coapinola en el mismo estado de Guerrero, el cual desemboca en el punto denominado la Barra o Bordo Blanco. Este río sirve como fuente de riego en los meses de lluvia y es el que le da fertilidad a los terrenos del bajío durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Este río pasa a escasos 700 metros de distancia de la población de Copala. A este río se le unen varios arroyos que alimentan a la corrientes principales: el río Marquelia, las lagunas de las Peñas, los canales Corredizos o cuerpos de agua como el de los Draguitos y Zacatón, canales de la Puente, la desembocadura del río que forma la barra al océano Pacífico, la laguna de Las Salinas, el charco Crucino, el arroyo El Carrizo, el canal de Mata de Mangle, la Bocana, Santa Rosa, Candelilla, la laguna de Chautengo y los canales la Fortuna.

Clima

Playa Ventura cuenta con un clima tropical, con lluvia en verano y, en menor proporción, en invierno. Los meses más calurosos son abril, mayo, junio, julio y agosto.

Su temperatura promedio anual es de: 19.8 °C mínima, 26 °C media y 32.2 °C máxima. El año más frío fue de 11 °C y el más caluroso fue de 40 °C.

Precipitación

Presenta una precipitación anual de 1,414.7 mm: el año más seco fue de 439 mm y el año más lluvioso fue de 1,734 mm. Los meses más lluviosos son junio, julio, agosto y septiembre, cuando arriban con mayor facilidad los huracanes y tormentas tropicales.

ÁREA DE ESTUDIO

El área de observación se concentra en los alrededores de Playa Ventura, incluyendo la costa, el estero (área de aguas pantanosas con influencia del mar), el río y los alrededores de selva baja caducifolia.

ÁREA DE ESTUDIO EN EL CONTEXTO LOCAL



Simbología

-  Huertos y cultivos
-  Laguna costera y río
-  Orilla de mar
-  Selva baja caducifolia

CARACTERÍSTICAS DE LAS AVES

Las aves junto con los peces, anfibios, reptiles y mamíferos forman el grupo de los vertebrados, es decir, aquellos animales que poseen columna vertebral. A pesar de su gran variación morfológica, fisiológica y su gran diversidad, las aves son fácilmente distinguibles por: las alas, que son una característica que hace a estos animales predominantemente voladores; las plumas como derivado de piel, le sirven para dos propósitos, conservación de la temperatura corporal (termorregulación) y el vuelo; el pico, que es una modificación de las mandíbulas desprovisto de dientes y cubierto por una capa dura.

Las aves presentan huesos y músculos modificados para el vuelo. Sus huesos son huecos y neumatizados, sus mandíbulas son fuertes y poco pesadas. Presentan un gran desarrollo de los músculos asociados al vuelo, así como un sistema nervioso en donde el sentido de la vista es el más desarrollado en comparación con todos los vertebrados. Hay aves que en invierno realizan sus migraciones a esta zona de Playa Ventura provenientes de Canadá y Estados Unidos por la ruta migratoria del Pacífico.

Son animales endotermos, es decir, capaces de regular la temperatura corporal usando el calor proveniente de su metabolismo.

Todas las aves son ovíparas ya que ponen huevos que depositan en nidos. La forma y los materiales que utilizan para construir sus nidos son muy variados, aunque generalmente tienen forma de copa, o bien son esféricos u ovalados y se elaboran con restos de material vegetal, así como de plumas, pelos y telarañas. Algunas aves, como los carpinteros, perforan la corteza de los árboles hasta hacer un hueco, que posteriormente es cubierto con diversos materiales. Otras aves solo llegan a ocupar nidos previamente construidos.

Además a diferencia de otros grupos de vertebrados terrestres, en su mayoría son de actividad diurna y algunas especies tienen colores vistosos, por lo que su observación es relativamente fácil y atractiva para muchas personas. Además se pueden encontrar en casi todos los ambientes y de acuerdo a su distribución original las podemos clasificar en especies residentes y especies migratorias. Las residentes son aquellas aves que están presentes a lo largo de todo

el año y las migratorias son aquellas que realizan desplazamientos desde Canadá y Estados Unidos hacia México y Centroamérica, y viceversa; esto se debe a la búsqueda de lugares propicios para la reproducción.

Entre la avifauna se puede encontrar una gran variedad de especies de distintos colores, tamaños y comportamientos. Estas especies pueden agruparse según de lo que se alimenten, aunque también existen algunas que su dieta es variable de acuerdo a la estación y a la abundancia de sus presas o alimento y no necesariamente son especialistas.

Las nectarívoras se caracterizan por presentar picos muy estilizados y largos, lo que les permite obtener el néctar de las flores llevándose también el polen en las plumas ubicadas cerca del pico.

Otro grupo que podemos encontrar en una comunidad de aves son las **granívoras**, las cuales se alimentan de semillas; estas aves presentan picos en forma de cono, cuyo tamaño puede variar proporcionalmente.

También están las **insectívoras** que, como dice su nombre, se alimentan de insectos. Estas aves presentan picos de tamaño mediano en forma de aguja; algunas especies cazan los insectos al vuelo y otras los buscan entre el follaje de las plantas.

Otro grupo interesante son las **frugívoras**; estas aves son eficientes dispersoras ya que al consumir frutos carnosos ingieren sus semillas. Estas semillas pasan un tiempo en el tracto digestivo del ave lo que permite que tenga un mayor éxito al momento de la germinación y que además sean transportadas a grandes distancias.

Y finalmente están las **carroñeras**, que se alimentan de organismos muertos y en proceso de descomposición.

Otra clasificación son: **las omnívoras** que consumen diversos recursos y **las carnívoras** como las rapaces, que se alimentan de otros animales más pequeños como ratones, conejos, lagartijas, peces y otras aves.

TOPOGRAFÍA DE UN AVE




Ilustración: Laura López Castillo, 2011

CÓMO FUNCIONA ESTA GUÍA

La guía de aves es una herramienta que permite al observador la rápida y correcta identificación de los organismos según sus características externas (plumaje y silueta), sus hábitos y los ambientes que ocupan. En particular, esta guía es fruto de la observación de las diferentes especies que habitan la comunidad de Playa Ventura. El principal objetivo es fomentar el conocimiento general de las aves de la localidad tanto entre los habitantes de la región como en sus visitantes.

Cada especie incluida en la guía posee una ficha descriptiva con la información necesaria para su identificación. En primer lugar encontrará el grupo al que pertenece (y un color de pestaña que lo diferencia de otros grupos), la imagen (silueta) del ave, su nombre científico en cursivas y su nombre común en español e inglés seguido de una serie de iconos.

Estos iconos pueden dar información sobre el hábitat que ocupa cada especie dentro del área de estudio, su estado de conservación según la NOM-059 y su estado de permanencia. También encontrará una fotografía de la especie, una descripción del ave, información sobre su alimentación y sobre el hábitat que suele ocupar. Finalmente un mapa de su distribución en México. En algunos de los mapas se podrán observar dos tonos de color: el tono oscuro indica el área donde la especie es residente y el tono claro, las zonas donde se les encuentra durante la migración en verano, otoño e invierno.

HOW THIS GUIDE WORKS

The bird guide is a tool that allows the observer to quickly and correctly identify organisms according to their external characteristics (plumage and silhouette), their habits and the environments they occupy. In particular, this guide is the result of observing the different species that inhabit the Playa Ventura community. The main objective of this is to promote the general knowledge of the birds of the town both in the inhabitants of the region and in its visitors.

Each species that the guide contains has a monograph with the information necessary for its identification. First, you will find the group to which it belongs (and a tab color that differentiates it from other groups), the image of the bird, its scientific name in italics and its common name and a series of icons.

These icons provide information about the habitat each species occupies within the study area, its conservation status according to NOM-059, and its permanence. You will also find a photograph of the species, a description of the bird, information about its diet and typical habitat, and a map of its distribution in Mexico. Some maps use two color tones: darker tones indicate the resident area, and lighter tones indicate areas where the species is found during migration in summer, autumn, and winter.

SIMBOLOGÍA

Los ambientes de las aves de Playa Ventura están identificados con los siguientes símbolos:



Huertos y cultivos



Laguna costera y río



Orilla de mar



Selva baja caducifolia



Generalista

Este símbolo refiere a las especies que ocupan un gran número de ambientes por lo que no pueden enmarcarse en uno solo.

Estado de conservación

Se basa en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010



Bajo protección especial:

Son aquellas especies que podrían llegar a encontrarse amenazadas por diversos factores que inciden negativamente en sus poblaciones, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación.



Amenazadas:

Son aquellas especies que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando los factores que inciden negativamente en sus poblaciones.



Peligro de extinción:

Aquellas especies cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural.

Estado de permanencia:



Residente



Migratoria



COLUMBIFORMES

Columbina inca

Tórtola de cola larga

Inca Dove



Foto: Alberto Rafael Hans Vadas Thomaes

Descripción:

Paloma pequeña (20 cm) y ligera. El plumaje es de color gris-café con un patrón escamoso en todo el cuerpo. La cola es larga, fina, termina con forma cuadrada en reposo y presenta plumas blancas en los laterales al vuelo.

Alimentación:

Semillas, frutas e insectos.

Hábitat:

Áreas urbanas, granjas y matorrales, principalmente zonas secas.



Mapa de distribución



Columbina passerina
Tortolita pico rojo
Common Ground-Dove

Descripción:

Tortolita pequeña (16 cm) y de cola corta. El plumaje presenta un patrón escamoso o punteado en el pecho y en la cabeza. Ojos rojizos y pico corto de base rosada. Sus alas redondeadas son negras y rojas al vuelo. Las patas son cortas y amarillas.

Alimentación:

Semillas e insectos.

Hábitat:

Matorrales y bordes de bosques, igual que la tortolita colilarga.



Foto: Claudia Cristina Valenzuela Inzunza



Mapa de distribución



GRUIFORMES

Gallinula galeata

Gallineta de frente roja

Common Gallinule



Foto: Alberto Rafael Hans Vadas Thomaes

Descripción:


El adulto es gris oscuro con la cabeza café, una banda blanca a lo largo del flanco y patas largas y verdes. Pico grueso de color blanco y amarillo en su extremo, presentan un escudo frontal usualmente amarillo y rojo. El juvenil es gris pálido de patas y pico claro.

Alimentación:


Plantas acuáticas y moluscos.

Hábitat:

Estanques con mayor cubierta de vegetación acuática en los márgenes de juncos.



Mapa de distribución



Fulica americana
Gallareta americana
American Coot

Descripción:

Ave acuática de plumaje homogéneo color gris muy oscuro, casi negro. El pico es corto pero grueso de color blanco, con un punto rojo en la base de los ojos, los cuales también son rojos. Las patas son semipalmadas y amarillentas.

Alimentación:

Plantas, insectos y peces. Se zambullen en el agua para encontrar el alimento.

Hábitat:

Ambientes acuáticos principalmente de agua dulce como lagos, lagunas costeras, embalses y pantanos.




Foto: Alberto Rafael Hans Vadas Thomaes



Mapa de distribución



CHARADRIIFORMES

Himantopus mexicanus

Monjita americana

Black-necked Stilt



Foto: Alberto Rafael Hans Vadas Thomaes

Descripción:


Tamaño mediano y cuerpo muy estilizado. Se caracteriza por unas patas largas y rosadas. El plumaje es negro en la parte superior, desde la corona hasta la cola, y blanco en la parte inferior. El pico es recto, alargado y negro, el ojo presenta una ceja blanca.

Alimentación:

Insectos, crustáceos y pequeños organismos acuáticos que busca en los suelos fangosos usando su pico.

Hábitat:

Pantanos con pasto, ciénegas, charcos, lagunas costeras poco profundas. Raramente en la orilla del mar.



Mapa de distribución



Anarhynchus nivosus
Chorlo nevado
Snowy Plover



Descripción:

Ave pequeña, de unos 15 cm de largo. Presenta un pico negro, delgado y corto, y en la cara una mancha negra posterior al ojo y otra en la frente.

Corona, espalda y alas son café claro, los flancos y el vientre son blancos con una mancha negra a cada lado del pecho. Las patas son cortas y oscuras.

Alimentación:

Insectos y otros invertebrados como moluscos y también algunos peces.

Hábitat:

Playas, planicies alcalinas y arenosas alrededor de lagunas saladas.



Foto: Rafael Rodríguez Brito



Mapa de distribución



Jacana spinosa
Jacana norteña
Northern Jacana



Fotos: David Ramírez Adame,
Ecatzin Alejandro Ramírez Segura

Descripción:

La cabeza y cuello son negruzcos mientras que el resto del cuerpo es color café intenso: Presenta un escudo amarillo en la frente, justo entre los ojos, de forma cuadrada y culminado en tres picos. El pico es alargado, puntiagudo, de color amarillo-anaranjado y en la base, azul pálido. Las patas son largas de tono verdoso. El juvenil es cafegrisáceo por la parte superior, blanquecino en la parte inferior y con una raya blanca sobre el ojo.

Alimentación:

Materia vegetal e invertebrados.

Hábitat:

Márgenes de lagos con vegetación herbácea y plantas flotantes, campos inundados, cunetas y pantanos.



Mapa de distribución



Actitis macularius
Playero alzacolita
Spotted Sandpiper

Descripción:

Presenta dos cambios de plumaje en el año en tonos grises y blancos. En época de anidación presenta unas manchas redondas y negras sobre el pecho y vientre blancos. El resto del año pierde esas manchas y queda el plumaje de la parte inferior del cuerpo blanco. El dorso junto con las plumas son de color parduzco. El pico es corto y anaranjado y oscuro en su extremo. Dos rayas, una blanca y una café oscura, cruzan la cara pasando por el ojo. Las hembras presentan un plumaje de anidación con manchas más grandes y oscuras.

Alimentación:

Principalmente insectos, pero también moluscos y otros invertebrados.

Hábitat:

Pantanos, lagos, ríos y es menos común en estuarios y playas.



Foto: Judith Areli Nájera Núñez



Mapa de distribución



Thalasseus maximus

Charrán real

Royal Tern



Foto: David Ramírez Adame

Descripción:

Golondrina marina de unos 50 cm de tamaño. Presenta un cuerpo chato y robusto. El pico es grueso y naranja. El plumaje es blanco en cabeza y cuello y de alas grisáceas, alargadas y acabadas en punta. En época reproductiva, presentan la parte superior de la cabeza en color negro, formando una cresta que sobresale en la parte posterior de la cabeza. Las patas son cortas, pequeñas y negras.

Alimentación:

Peces, pequeños animales marinos y algunos crustáceos.

Hábitat:

Costas, playas, bahías de estuarios, también islas arenosas y lagos cuando son cercanos a la costa.



Mapa de distribución



Thalasseus elegans
Charrán elegante
Elegant Tern

Descripción:

Golondrina marina de menor tamaño y más delgada que la anterior, de unos 40 cm de longitud. Muy similar al charrán real pero con el pico más largo, delgado, ligeramente curvado hacia abajo y de color amarillo intenso. La cola no es tan bifurcada como en la anterior especie. Al igual que el otro charrán, presenta un copete negro con cresta en época reproductiva.

Alimentación:

Principalmente peces o animales marinos pequeños que caza zambulléndose en el agua y algunos crustáceos.

Hábitat:

Playas, costas rocosas, bahías costeras y lagunas costeras, nunca tierra adentro.



Foto: Óscar Josué Amaro Flores



Mapa de distribución



SULIFORMES

Fregata magnificens

Fragata magnífica

Magnificent Frigatebird



Descripción:

Ave de plumaje negro, alas largas y angulosas, cola en forma de tijera. El macho es totalmente negro con el saco gular rojo. La hembra tiene la garganta y cabeza negras pero el pecho es blanco. El juvenil es de cabeza y pecho blanco.

Alimentación:

Peces, calamares, medusas y crustáceos cercanos a la superficie del agua. Esta ave roba el alimento a otras especies de aves marinas, además llega a atrapar pequeñas tortugas.

Hábitat:

Frecuenta las costas, se posa sobre árboles, acantilados y embarcaciones. En las zonas tropicales se halla en estuarios.

Foto: Alberto Rafael Hans Vadas Thomaes



Mapa de distribución



Nannopterum brasilianum

Cormorán neotropical

Neotropic Cormorant

Descripción:

Cuerpo delgado y de tono oscuro. Presenta un saco gular de piel desnuda de color amarillo pálido y una cola distintivamente larga. Los adultos tienen el plumaje negro y en época reproductiva presentan un borde blanco que rodea el buche y mechones blancos a los lados de la cabeza. Los juveniles presentan un plumaje pardusco.

Alimentación:

Principalmente anchovetas, bagres y corvinas.

Hábitat:

Lagos, pantanos, lagunas costeras, manglares y en el mar cerca de la costa.



Foto: Jorge Enrique Díaz Noyola



Mapa de distribución



PELECANIFORMES

Pelecanus occidentalis

Pelícano café

Brown Pelican



Descripción:

Ave oscura, de 2 m de envergadura, con un pico muy voluminoso y con una bolsa gular. El plumaje del adulto es café grisáceo con cabeza y cuello en tonos blancos (la parte posterior del cuello es castaña en época reproductiva). El juvenil es café al principio y va cambiando gradualmente al plumaje adulto.

Alimentación:

Peces y crustáceos, que caza con su enorme pico. Además, mantiene a sus presas en la bolsa gular.

Hábitat:

Principalmente en las costas y es muy raro observarlo tierra adentro.

Fotos: Édgar Enrique Neri Castro,
Judith Areli Nájera Núñez



Mapa de distribución



Tigrisoma mexicanum
Garza tigre mexicana
Bare-throated Tiger-Heron



Descripción:

Presenta corona negra, garganta desnuda de color amarillo-verdoso a naranja, cuello y espalda finamente barrados en negro, vientre color café mate. Juvenil con garganta amarilla y plumaje totalmente barrado.

Alimentación:

Peces, anfibios, crustáceos y roedores.

Hábitat:

Arroyos arbolados, lagunas costeras, manglares, pantanos y lagos temporales.



Foto: Jorge Enrique Díaz Noyola



Mapa de distribución





Ardea herodias

Garza morena

Great Blue Heron



Descripción:

Garza de gran tamaño, con patas y cuello largos, pico afilado. Al vuelo dobla el cuello y sobresalen sus patas. Plumaje del cuerpo color gris azulado con cabeza blanca en adultos y una raya negra por encima del ojo. Los individuos a menudo tienen manchas de color rojizo o plumas negras a sus lados.

Alimentación:

Principalmente peces pero también aves, ranas, salamandras, lagartijas, serpientes, pequeños mamíferos, camarones, cangrejos y libélulas.

Hábitat:

Zonas templadas y tropicales cerca de cuerpos de agua incluyendo lagunas costeras, pantanos y lagos.

Fotos: Alberto Rafael Hans Vadas Thomaes



Mapa de distribución



Ardea alba
Garza blanca
Great Egret

Descripción:

De tamaño grande, esbelto, de plumaje totalmente blanco, con cuello largo, pico amarillo, patas y pies negros. En época reproductiva le crecen unos plumones blancos en la espalda. Ambos sexos mantienen características muy similares a lo largo de su vida.

Alimentación:

Peces, ranas, serpientes, ratones, grillos e insectos acuáticos.

Hábitat:

En agua salada o dulce, en lagos, ríos, arroyos, pantanos y estuarios.



Fotos: Alberto Rafael Hans Vadas Thomaes,
Ecatzin Alejandro Ramírez Segura



Mapa de distribución





Egretta thula

Garza dedos dorados

Snowy Egret



Foto: Jorge Enrique Díaz Noyola

Descripción:

Cuerpo pequeño de plumaje blanco, presenta patas negras pero con los dedos color amarillo, el pico es negro con destellos amarillos. La parte anterior de los ojos color amarillo o rojo en periodo de anidación. El juvenil puede tener las patas verdosas y la base del pico gris.

Alimentación:


Peces e invertebrados como lombrices, gusanos, cangrejos, camarones y caracoles, en ocasiones llega a comer ranas, sapos, lagartijas y serpientes.

Hábitat:

Ambientes dulceacuícolas pero también en playas, pantanos salobres, lagunas y manglares.



Mapa de distribución



Egretta caerulea
Garza azul
Little Blue Heron

Descripción:

Garceta esbelta, de tamaño mediano. El adulto es azul grisáceo con un toque de rojo-violeta en el cuello, patas oscuras, pico delgado azul con punta negra y ligeramente curvado. El juvenil tiene patas verdosas y plumaje de color blanco, cuando está mudando presenta parches blancos y azules.

Alimentación:

Peces, ranas, lagartijas, crustáceos e insectos que por lo general caza de forma inactiva y esperando la ocasión.

Hábitat:

Cerca del agua salada pero prefiere agua dulce como lagos, pantanos, lagunas, pastizales y orillas del mar abierto.



Foto: Alberto Rafael Hans Vadas Thomaes



Mapa de distribución



Ardea ibis

Garza ganadera

Cattle Egret



Foto: Alberto Rafael Hans Vadas Thomaes

Descripción:

Tamaño mediano pero más robusto que la garza dedos dorados. Plumaje completamente blanco excepto durante la nidificación. En la nidificación el pico es amarillo y las patas rosas, la corona, el pecho y el dorso rojizos. Se distingue de las otras garzas por tener patas cortas y cuello grueso.

Alimentación:

Principalmente de artrópodos como insectos, arañas y chapulines, además de algunos vertebrados como las ranas. Siempre está asociado al ganado.

Hábitat:

Bosques, lugares con ganado y cultivos.



Mapa de distribución



Butorides virescens

Garcita verde

Green Heron

Descripción:

Garza pequeña, con cuello muy largo (que suele mantener retraído) y patas cortas, naranjas o amarillo-verdosas. Los adultos presentan la corona con un penacho de plumas de color verde oscuro que siguen hacia el dorso; las alas son grises; el cuello es blanco rayado en café y los laterales son cafés. La hembra es más pequeña y pálida que el macho. Los juveniles son también de colores más tenues, con el cuello y las partes inferiores café con blanco y las alas verduzcas.

Alimentación:

Pequeños peces, anfibios e invertebrados (sanguijuelas, gusanos, libélulas, chinches de agua y cangrejos).

Hábitat:

Pantanos, estanques, lagunas, manglares. Rara vez en áreas abiertas, por lo general en zonas con márgenes arbustivos.



Foto: Judith Areli Nájera Núñez



Mapa de distribución





Nycticorax nycticorax

Garza nocturna corona negra

Black-crowned Night-Heron



Foto: Alberto Rafael Hans Vadas Thomaes

Descripción:

Cuerpo ancho y robusto, de tamaño mediano y cuello corto, patas cortas y amarillas en juveniles. El adulto con corona y espalda negras, alas grises, patas amarillas. El pico es fuerte y negro, con ojos color rojo. En época reproductiva presenta dos largas plumas blancas en la cabeza. El juvenil es café con manchas y rayas blancas. De hábitos nocturnos, pero pueden pararse encorvados sobre árboles o en ciénagas durante el día.

Alimentación:

Peces, ranas, sapos, lagartijas y víboras además de crustáceos e insectos; se le ha observado comiendo pequeñas tortugas marinas.

Hábitat:

Ambientes dulceacuícolas y pantanos salobres, también se les ve en la orilla del mar; es altamente susceptible a pesticidas en estos ambientes.



Mapa de distribución



CATHARTIFORMES

Coragyps atratus

Zopilote común

Black Vulture

Descripción:

Ave negra de 1.5 m de envergadura. Presenta la cabeza desnuda y gris oscura, y se distingue al vuelo por el parche blancuzco cerca de la punta de las alas.

Alimentación:

Carroña, principalmente de peces, tortugas marinas y mamíferos marinos que aparecen muertos en la orilla de la playa; también se les ha observado comiendo crías de tortugas.

Hábitat:

Costas, orillas de bosques, fincas, pueblitos, ciudades, campo abierto, etc.



Foto: Alberto Rafael Hans Vadas Thomaes



Mapa de distribución



Cathartes aura
Zopilote aura
Turkey Vulture



Descripción:

Cuerpo negro, con una envergadura de 1.7 m. La cabeza desnuda es roja en adultos y negruzca en juveniles. En vuelo se distingue una franja inferior clara en las plumas primarias, secundarias y terciarias del ala.

Alimentación:

Carroña. Esta ave es de gran importancia ya que es un eficiente consumidor de cadáveres.

Hábitat:

Bosques, matorrales y zonas abiertas con márgenes arbustivos.

Fotos: David Ramírez Adame,
Félix Santiago Quiroz



Mapa de distribución



ACCIPITRIFORMES

Pandion haliaetus

Aguila pescadora

Osprey

Descripción:

Partes superiores y espalda oscuras, partes inferiores y vientre blancos con manchas de café oscuro. En la cabeza presenta una franja negra a los lados de la cara, los ojos son amarillos, posee unas plumas largas en la cabeza que eriza en forma de cresta. Cola larga y alas muy angulosas. Machos y hembras difíciles de distinguir. Juveniles de plumaje más pálido y con manchas café claro.

Alimentación:

Peces que caza usando sus garras.

Hábitat:

Común en algunas áreas costeras y cerca de grandes lagos. Construye su voluminoso nido de ramas sobre árboles desnudos o postes.



Foto: Édgar Enrique Neri Castro



Mapa de distribución



Rupornis magnirostris
Aguililla caminera
Roadside Hawk



Foto: Jorge Enrique Díaz Noyola

Descripción:

Ave de tamaño mediano. Las alas son angulares y puntiagudas y la cola es relativamente larga. Plumaje de color café o grisáceo, partes inferiores barradas de color café-rojizo, alas rojizas y cola con bandas. Juveniles con plumaje más café que adultos.

Alimentación:

Insectos y pequeños vertebrados.

Hábitat:

Áreas abiertas, en especial en humedales, y menos frecuente en el bosque.



Mapa de distribución



Buteo plagiatus
Aguililla gris
Gray Hawk

Descripción:

Rapaz de tamaño mediano. Adulto de color gris y blanco, rabadilla blanca, partes inferiores barradas y cola con amplias bandas. Los juveniles son de color café.

Alimentación:

Pequeños vertebrados, como reptiles, aves e insectos.

Hábitat:

Áreas de selva baja caducifolia, es menos común en áreas abiertas con pocos árboles.



Foto: Alberto Rafael Hans Vadas Thomaes



Mapa de distribución



PICIFORMES

Melanerpes chrysogenys

Carpintero enmascarado

Golden-cheeked Woodpecker



Foto: David Ramírez Adame

Descripción:

De unos 20 cm de longitud, este carpintero presenta la espalda, las alas y la rabadilla rayadas en blanco y negro. El pico es largo y negro, alrededor del ojo presentan un parche negro y las mejillas son amarillas. En los machos la corona es roja y la nuca amarilla, mientras que las hembras no presentan esta corona. La cola es corta y barrada en blanco y negro y las patas son cortas con pies trepadores, es decir, con dos dedos hacia delante y dos hacia atrás.

Alimentación:

Insectos. Perfora la corteza de los árboles y atrapa presas con su lengua larga, pegajosa y prensil.

Hábitat:

Bosques densos, zonas arboladas y ciudades.



Mapa de distribución



FALCONIFORMES

Caracara plancus

Caracara, quebrantahuesos

Crested Caracara

Descripción:

Alcanza un tamaño de entre 50-60 cm de largo total. La cara y gran parte del pico son color rojo, la punta del pico es gris y en la cabeza presenta una cresta oscura. Las partes superiores y los muslos son negros, el pecho es blanco y barrado en negro, la cola está barrada en puntas negras y las patas son amarillas. No se diferencian los sexos y los juveniles son de colores más apagados que los adultos.

Alimentación:

Carroña, pero también caza pequeños vertebrados e invertebrados.

Hábitat:

Zonas boscosas y semiabiertas con árboles aislados y arbustos.



Foto: Alberto Rafael Hans Vadas Thomaes



Mapa de distribución



Falco sparverius
Cernícalo americano
American Kestrel



Foto: Óscar Josué Amaro Flores

Descripción:

Rapaz de tamaño pequeño, ambos sexos presentan unas franjas nítidas en la cara. El macho es de menor tamaño que la hembra y presenta una cola café-rojiza con la punta negra, espalda café-rojiza y alas azul-grisáceas. Las hembras tienen un plumaje más café y con más pintas oscuras.

Alimentación:

Principalmente de largartijas, insectos, algunos roedores y aves pequeñas.

Hábitat:

Campo abierto, granjas, desiertos y pueblos. Anida en cavidades de árboles o cactus.



Mapa de distribución



PASSERIFORMES

Pyrocephalus rubinus

Mosquero cardenalito

Vermilion Flycatcher

Descripción:

Ave de cuerpo robusto. Presenta un fuerte dimorfismo sexual. Los machos tienen un plumaje color rojo muy intenso en vientre y corona, la parte dorsal es color café oscuro junto con las alas y la cola. El plumaje de la hembra y el juvenil es principalmente gris y blanco, con ligeras rayas en el pecho y un deslavado rosa o amarillo en el vientre. El pico es corto y oscuro.

Alimentación:

Insectos que caza al vuelo.

Hábitat:

Cerca del agua, bosques abiertos, tierras bajas de pino, sabanas abiertas, matorrales e incluso zonas ajardinadas de áreas urbanas. Suele perchar en árboles dispersos y es muy territorial.



Foto: Olivia Osorio León



Mapa de distribución



Pitangus sulphuratus

Luis grande o Luis bienteveo

Great Kiskadee



Foto: Óscar Josué Amaro Flores

Descripción:

Mosquero de cuerpo robusto. El plumaje es muy llamativo, con el pecho y vientre amarillos, las alas y la cola rojo óxido brillante y la cabeza con franjas blancas y negras. Presenta una mancha amarilla en la corona, muy notoria, que permite distinguirlo de otras especies de luis. El pico es alargado y negro. Su canto es ruidoso y chillón, lo que permite distinguirlo fácilmente.

Alimentación:

Insectos, bayas y, en ocasiones, peces pequeños.

Hábitat:

Bosques a la orilla de los ríos, árboles cerca de estanques, márgenes de bosque.



Mapa de distribución



Tyrannus melancholicus

Tirano piriri

Tropical Kingbird

Descripción:

Tirano de 20 cm de longitud. De cabeza gris claro y antifaz gris más oscuro, pecho y vientre amarillos, alas cafés grisáceas y cola café pálido ahorquillada. Es el tirano más común del trópico americano.

Alimentación:

Insectos que caza al vuelo y, en ocasiones, pequeños frutos.

Hábitat:

Áreas abiertas o semiabiertas con árboles aislados, playas con matorral, claros de bosque, etc. Habita en árboles grandes cerca de estanques y arroyos en tierras bajas.



Foto: Rafael Rodríguez Brito



Mapa de distribución





Tyrannus forficatus
Tirano tijereta rosado
Scissor-tailed Flycatcher



Foto: Óscar Josué Amaro Flores

Descripción:

Tirano de cuerpo estilizado. El plumaje del cuerpo es gris perla, flancos anaranjados, alas gris oscuro pero con las cobertoras interiores color naranja-rosado. La cola es larga, de color blanco y negro, en forma de tijera visible al vuelo, queda cerrada cuando el ave está perchada; en hembras y juveniles es más corta.

Alimentación:

Principalmente insectos voladores; algunos ejemplares también comen frutos.

Hábitat:

Bordes de caminos, mezquites y campos semiabiertos con árboles aislados. Se reproduce en zonas áridas y semiáridas de matorral arbustivo. Suele perchar en alambradas.



Mapa de distribución



Mimus polyglottos
Centzontle norteño
Northern Mockingbird

Descripción:

Ave mediana, capaz de imitar cantos de otras aves, como el resto de los mímidos. De cuerpo delgado, su plumaje es gris claro con parches blancos en las alas que se hacen visibles en el vuelo. Cola larga con las plumas externas e internas oscuras. Las patas son largas y negras. El juvenil tiene rayas oscuras en el pecho y los ojos más oscuros que el adulto. En el suelo suele levantar las alas mostrando sus parches blancos.

Alimentación:

Variedad de artrópodos, frutos, flores e inclusive gecos.

Hábitat:

Zonas semiabiertas como ciudades, granjas, orillas de bosques, desiertos. Anida en árboles espinosos.



Foto: Rafael Rodríguez Brito



Mapa de distribución



Icterus spurius
Bolsero castaño
Orchard Oriole




Foto: Óscar Josué Amaro Flores

Descripción:

Calandria de tamaño mediano de color oscuro. Rabadilla y partes ventrales color castaño oscuro y cabeza, cuello, espalda y alas color negro. Las hembras son de color verde oliva en las partes superiores y verde amarillento en las inferiores. Presentan dos barras blancas en el ala. El pico es puntiagudo ligeramente curvado hacia abajo. Los juveniles son muy similares a las hembras pero con la garganta negra.

Alimentación:

Insectos, bayas y néctar.

Hábitat:

Vegetación secundaria, bosque de ribera, zonas arbustivas, jardines con árboles y campos de cultivo.



Mapa de distribución



Icterus pustulatus
Calandria dorso rayado
Streak Backed Oriole

Descripción:

Calandria de tamaño mediano. Los machos son de color amarillo anaranjado, con la cabeza de color más intenso y la garganta negra punteada hacia los costados, alas de plumas negras con bordes blancos. La hembra es más opaca con la espalda más olivácea. El juvenil es muy parecido a la hembra pero no tiene la garganta negra. Se caracterizan por tener la espalda rayada en negro. Cola larga y negra. Pico alargado y puntiagudo.

Alimentación:

Insectos y semillas.

Hábitat:

Zonas áridas y semiáridas en áreas semia-biertas con árboles y arbustos dispersos, o en plantaciones.



Foto: Frabrizio Varela Boydo



Mapa de distribución



Quiscalus mexicanus

Zanate mexicano

Great-tailed Grackle



Foto: César Daniel Jiménez Piedragil

Descripción:

Ave grande. El macho es color negro brillante mientras que la hembras tiene la ceja y las partes inferiores color café claro. El pico es grande y largo, las patas largas, negras y fuertes. El único toque de color lo tienen los ojos que son amarillos. Anida en colonias y viaja en parvadas, es muy social y se reúne en grupos muy numerosos y ruidosos, de canto muy agudo y sonante.

Alimentación:

Insectos, pequeñas frutas, semillas, fauna acuática, etc.

Hábitat:

Vegetación secundaria, arbustiva, densa, campos de cultivo, granjas, parques, manglares, playas lodosas, pueblos y ciudades.



Mapa de distribución

BIBLIOGRAFÍA

Chesser, R. T., Billerman, S. M., Burns, K. J., Cicero, C., Dunn, J. L., Hernández-Baños, B. E., Jiménez, R. A., Johnson, O., Mason, N. A. & Rasmussen, P. C. (2026). *Check-list of North American Birds* (versión en línea). American Ornithological Society.

Floyd, T. (2025). *National Geographic field guide to the birds of the United States and Canada* (8a. ed.). National Geographic.

Howell, S. N. G., & Webb, S. (1995). *A guide to the birds of Mexico and northern Central America*. Oxford University Press.

Navarro-Sigüenza, A. G., Rebón-Gallardo, M. F., Gordillo-Martínez, A., Townsend Peterson, A., Berlanga-García, H. Sánchez-González, L. A. (2014). *Biodiversidad de aves en México*. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 85, S476-S495.

Peterson, R. T., & Chalif, E. L. (1989). *Aves de México: Guía de campo. Identificación de todas las especies encontradas en México, Guatemala, Belice y El Salvador* (M. Ramos y M. I. Castillo, trads.). Editorial Diana.

Sibley, D. A. (2003). *The Sibley field guide to birds of western North America*. Alfred A. Knopf. Inc.

Van Perlo, B. (2006). *Birds of México and Central America*. Princeton University Press.

Notas

[illegible]

Guía de aves comunes de Playa Ventura, Copala, Guerrero.
Se terminó en agosto de 2026.

Playa Ventura es un escenario privilegiado para la observación de aves, donde convergen especies asociadas a distintos hábitats naturales. Entre la orilla del mar y la laguna costera es posible apreciar aves acuáticas residentes, así como especies migratorias provenientes de Estados Unidos y Canadá. Al adentrarse hacia la planicie costera, el paisaje revela también aves características de la selva baja caducifolia y de las zonas de cultivo, conformando un mosaico de gran riqueza biológica.

Esta guía explora la estrecha relación entre las aves y los ecosistemas que habitan, destacando su importancia ecológica y los servicios ambientales que brindan a la región. Asimismo, invita a reflexionar sobre las amenazas que actualmente enfrentan estos entornos naturales debido al acelerado desarrollo urbano que avanza sobre muchas playas mexicanas.

A través de la observación cuidadosa y del conocimiento de las especies locales, esta obra ofrece una mirada accesible e integral dirigida tanto a turistas responsables y amantes de las aves como a los habitantes de la comunidad, con la esperanza de contribuir, en el futuro, a la valoración y conservación de la avifauna de Playa Ventura.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS